

Mýtus: Bojím se rakoviny děložního čípku, protože ji měla má matka.

Rozšířeným mýtem je, že rakovina děložního čípku je dědičná. S onemocněním se může ve skutečnosti setkat jakákoliv žena či dívka bez ohledu na to, zda se předtím nemoc vyskytla v její rodině. Vakcinace by tak měla být prvním krokem k prevenci před tímto závažným onemocněním.



Myslíte si, že prevence rakoviny děložního čípku může počkat?

Zamyslete se nad tím znovu.

**Zastavte se
a přemýšlejte minutu
o rakovině děložního čípku.**



Očkovací kalendář

1. dávka aplikována (datum):

2. dávka aplikována (datum):

3. dávka aplikována (datum):

Pro více informací o rakovině děložního čípku a možnostech prevence tohoto onemocnění, navštivte stránky www.cervarix.cz.

Vakcína Cervarix™ je určena pro dívky a ženy ve věku 10 až 25 let a chrání před určitými vysoce rizikovými HPV typy, které způsobují více než 80 % případů rakoviny děložního čípku.

Očkování je primární prevencí. Kombinace preventivních prohlídek a očkování je vhodnou formou prevence.

Reklama na léčivý přípravek. Cervarix™ je vakcína proti lidskému papilomaviru (typy 16, 18), rekombinantní, adjuvovaná, adsorbovaná, určená k prevenci cervikálního karcinomu u dívek a žen ve věku 10 až 25 let. Přípravek je pouze na lékařský předpis a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před použitím si pečlivě přečtěte příbalový leták. Vakcína nemá terapeutický efekt v případě již probíhajícího onemocnění.

CZ/CAR/0018/11



GlaxoSmithKline s.r.o., Na Příkopcích 17/1685, 140 21 Praha 4,
tel: 222 001 111, fax: 222 001 444, www.gsk.cz

NENÍ NA CO ČEKAT

Rakovinou děložního čípku v ČR onemocní každý rok **1 000** žen a **400** žen na ni zemře

Myslete na svou budoucnost – **chrňte se očkováním**



**AKCE
ZDRAVOTNÍCH
POJIŠŤOVEN***

* Aktuální příspěvky na očkování proti rakovině děložního čípku sledujte na webových stránkách vaší zdravotní pojišťovny.

Cervarix™



Mýtus: Očkování je pouze pro mladé dívky.

Očkování před zahájením sexuálního života je tou nejvhodnější dobou, ale z očkování mohou mít prospěch také ženy již sexuálně aktivní.

Mýtus: Rakovinu děložního čípku včas poznám díky pravidelným prohlídkám u gynekologa.

Některé formy rakoviny děložního čípku mohou být velmi rychlé (zvláště pokud nejsou prohlídky prováděné pravidelně 1x ročně), nebo skryté.

Adenokarcinom je forma rakoviny děložního čípku, která je ukrytá v děložním kanále a těžce odhalitelná i při pravidelných prohlídkách.



- Celosvětově je rakovina děložního čípku druhé nejčastější onemocnění rakovinou u žen.
- Rakovina děložního čípku je způsobena rizikovými HPV typy. Těto infekci lze předejít očkováním.
- V České republice tuto diagnózu vyslechne každoročně přes 1 000 žen a více než 400 jich na toto onemocnění zemře.
- Očkování ve spojení s pravidelnými preventivními prohlídkami je vhodná forma ochrany před rakovinou děložního čípku.

Zastavte se a minutu přemýšlejte.

Rakovina děložního čípku je způsobena rizikovými HPV typy. V České republice tuto diagnózu vyslechne každoročně přes 1000 žen a více než 400 jich na toto onemocnění zemře. Ale mnohé o této nemoci nemají dostatečné znalosti. Vyhradte si prosím minutu svého času a přečtěte si, jak můžete tomuto onemocnění předejít.

O jaké onemocnění se jedná?

Jedná se o rakovinu děložního čípku. Na rozdíl od jiných druhů rakoviny není podmíněně závislá na historii onemocnění v rodině, protože je způsobována virovou infekcí. Celosvětově se po rakovině prsu jedná o druhé nejčastější onemocnění rakovinou u žen.

Co onemocnění způsobuje?

Rakovinu děložního čípku způsobuje infekce lidským papilomavirem (HPV). Existují vysoce rizikové HPV typy. Mezi nejzávažnější patří HPV typy 16 a 18, které jsou zodpovědné za více než 70% případů rakoviny děložního čípku. Další 3 nejčastější HPV typy 31, 33 a 45 jsou zodpovědné za dalších 10–12% případů rakoviny děložního čípku. K přenosu dochází při sexuálním styku i pouhým kontaktem s pokožkou. Kondomy nenabízejí úplnou ochranu.

Kdo je nejvíce ohrožen?

Ohroženy jsou všechny ženy, které žijí sexuálním životem. Jsou v riziku získání HPV infekce a následného rozvoje předrakovinných změn na děložním čípku.

Kdy je vhodná doba pro očkování?

Nejvyšší účinnosti dosahuje očkování při aplikaci před začátkem sexuálního života. Profitovat z vakcinace ale mohou také ženy již sexuálně žijící.

Všimnu si nějakých příznaků infekce?

V raných fázích se často neobjevují žádné příznaky. Rozvoj rakoviny děložního čípku trvá obvykle mnoho let. Časně změny na děložním čípku lze odhalit pomocí pravidelných preventivních gynekologických prohlídek.

Jak se mohu bránit rakovině děložního čípku?

Nejdůležitější je zabránit příčině tohoto onemocnění, a to HPV infekci. Účinnou ochranu neposkytuje v tomto případě ani kondom, jak se mnohdy dívky mylně domnívají. K HPV nákaze stačí pouhý kontakt kůže v genitální oblasti. Nákaze lze zabránit tím, že se necháte očkovat. Očkování ve spojení s pravidelnými preventivními prohlídkami je vhodná forma ochrany před onemocněním. Začít s pravidelnými návštěvami gynekologa se doporučuje při dosažení 15 let věku, jejich opakování je pak vhodné každý rok. Než se rozhodnete pro očkování, měla byste si promluvit s lékařem.

Jakou ochranu očkování poskytuje?

Očkování vakcínou Cervarix™ chrání před 5 nejčastějšími onkogenními typy HPV virů, které způsobují více než 80 % případů rakoviny děložního čípku.

Na základě posledních známých medicínských dat dnes můžeme říci, že vakcína Cervarix™ ochrání téměř 9 z 10 HPV naivních dívek* před závažnými přednádorovými změnami na děložním čípku.

www.cervarix.cz

* HPV naivní dívky – dívky, které se dosud nesetkaly s onkogenními HPV typy.

Jsem na očkování příliš mladá nebo stará?

Očkování vakcínou Cervarix™ proti rakovině děložního čípku je určené pro dívky a ženy mezi 10 a 25 lety. O tom, zda je pro vás očkování vhodné, si promluďte se svým lékařem.

Mám stabilní vztah, měla bych se i přesto nechat očkovat?

I když máte dlouhodobý vztah, můžete být stále v riziku a očkování by pro vás mělo být přínosné. Pomocí očkování a pravidelných preventivních prohlídek pomáháte své ochraně do budoucna.

Jak se provádí očkování?

Očkování sestává ze tří injekcí během období šesti měsíců, které provede váš lékař. K zajištění vysoké účinnosti vakcíny je důležité dokončit celé očkovací schéma aplikací všech tří dávek. Po očkování byste také měla pokračovat v pravidelných preventivních prohlídkách.

Co bych měla udělat dál?

Po přečtení tohoto letáku navštivte, prosím, webové stránky **www.cervarix.cz**, kde se o tomto onemocnění i očkování dozvíte víc. Dalším krokem by mělo být objednání u vašeho lékaře.



Jak se rakovina děložního čípku vyvíjí?

Prodělaná HPV infekce nevytváří dostatečnou imunitní ochranu před opakovanou infekcí. Pokud HPV infekce na děložním čípku přetrvává, může se časem vyvinout v rakovinu děložního čípku.

Každá sexuálně aktivní žena je v průběhu života vystavovaná riziku opakované infekce.

