



Vážená paní,

již užíváte nebo uvažujete o užívání hormonální substituční terapie. Užívání substituční terapie zabrání vzniku některých nepříznivých stavů vznikajících v souvislosti s nedostatečnou produkcí estrogenních hormonů ve Vašem organismu (např. návaly horka a pocení). Tato léčba, přestože se Vám snažíme podávat nejnižší ještě účinnou dávku, má však i některé negativní vlivy. Abychom pro Vás minimalizovali případná rizika, potřebujeme znát odpovědi na následující otázky. Děkujeme za Váš čas. Správnou odpověď prosím zakroužkujte.

Kouření: _____ ano ne

Vysoký krevní tlak : _____ ano ne

Srdeční onemocnění: _____ ano ne

Migréna: _____ ano ne

Nádory prsu: _____ ano ne

Jaterní onemocnění: _____ ano ne

Nádory prsu: _____ ano ne

Cukrovka: _____ ano ne

Epilepsie: : _____ ano ne

Srdeční onemocnění: _____ ano ne

Infarkt myokardu a /nebo cévní mozková příhoda u Vás _____ ano ne

*Infarkt myokardu a /nebo cévní mozková příhoda _____ ano ne
u pokrevních příbuzných do 40 let věku

*Hluboká žilní trombóza u Vás: _____ ano ne

*Hluboká žilní trombóza - pokrevní příbuzní _____ ano ne

*Těhotenské komplikace (viz níže) _____ ano ne

Opakovaný potrat nebo předčasný porod
Předčasné odloučení placenty
Opožděný růst plodu
Rozštěpové vady páteře plodu
Náhlé nitroděložní úmrtí plodu
Preeklampsie (zvýšený krevní tlak a selhávání ledvin)

V případě, že jste **odpověděla „ano“** na některou ze čtyř posledních otázek (označeno*), je velmi vhodné provedení genetického prediktivního testu TromboGen®, který vyloučí přítomnost tzv. trombofilních stavů (zvýšené riziko trombózy a embolie). Test je v těchto případech **hrazen zdravotní pojišťovnou**.

V případě, že jste **odpověděla „ne“** na některou ze čtyř posledních otázek (označeno*), není přítomnost trombofilního stavu u Vás vyloučena (nemusel se zatím projevit, frekvence výskytu v populaci je 2 – 15%). Vyšetření Trombogen® však v tomto případě **zdravotní pojišťovna nehradí**. Pokud však chcete v průběhu užívání nebo před nasazením hormonální substituce vědět, zda netrpíte trombofilním stavem, je možné vyšetření provést za přímou úhradu.

Proč je genetický test TromboGen® vhodný u uživatelek hormonální substituce?

Riziko žilní trombózy a embolie je u uživatelek hormonální substituce zvýšeno asi 2 – 4x. Pokud jsou však tyto uživatelky současně dosud nerozpoznanými nositelkami některých trombofilních stavů, je riziko zvýšeno až 15x.

Jak se Trombogen® provádí?

Jde o běžný krevní odběr v naší ambulanci. Odběru předchází informovaný souhlas.

Potvrzuji, že jsem byla seznámena s možnostmi detekce přítomnosti trombofilních stavů u uživatelek hormonální substituce a se způsobem užívání hormonální substituce. Byla jsem poučena o nutnosti prostudovat příbalový leták předepsaného preparátu a respektovat v něm uvedená doporučení.

V Opavě dne:

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Váš podpis:

Děkujeme Vám za spolupráci a přejeme plnou spokojenost s předepsanou hormonální substitucí.

V případě nejasností se neváhejte na cokoliv zeptat.